

●費用はどのくらいかかりますか？

先進医療の費用として314～350万円必要です。  
※詳細は実施施設にお問合せください。

●重粒子線治療はどんな治療ですか？

重粒子線(炭素イオン線)という種類の放射線を体の外から照射して腫瘍を治療する方法です。放射線医学総合研究所では、1994年に治療を開始し2016年までに10,000人以上の方に治療を行いました。通常の放射線治療に抵抗性の腫瘍(腺癌、腺様嚢胞癌、悪性黒色腫、肝細胞癌、肉腫など)で有効性が認められています。さらに短期の治療が可能なのも特徴です。これまでに蓄積された臨床研究データをもとに、更なる治療成績の向上、治療の標準化に取り組んでいます。

この臨床試験を行っている施設

下記の重粒子線治療施設では、本治療の保険収載に向け、新たに先進医療Bとして厚労省から承認された臨床研究に取り組んでいます。

量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所病院  
〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4-9-1  
TEL:043-206-3306(代表) Tel:043-284-8852(相談窓口)  
URL: <http://www.nirs.qst.go.jp/hospital/index.shtml>

群馬大学重粒子線医学研究センター  
〒371-8511 群馬県前橋市昭和町三丁目39-22  
TEL:027-220-7111(代表)  
URL: <http://heavy-ion.showa.gunma-u.ac.jp/>


九州国際重粒子線がん治療センター  
〒841-0071 佐賀県鳥栖市原古賀町3049番地  
TEL:0942-81-1897  
URL: <http://www.saga-himat.jp/>

神奈川県立がんセンター  
〒241-8515 神奈川県横浜市旭区中尾2-3-2  
TEL:045-520-2222  
URL: <http://kcch.kanagawa-pho.jp/i-rock/about/index.html>

局所進行すい癌に対する  
化学療法併用重粒子線治療の  
臨床試験(先進医療B)  
について



患者さん向け

J-CROS; Japan Carbon-ion Radiation Oncology Study Group



国内重粒子線治療施設では、更なる保険収載疾患の拡大に向けて、多施設共同臨床研究組織(J-CROS)により連携を図っています。

放射線医学総合研究所における  
重粒子線治療の患者数 1994年6月～2016年3月



放射線医学総合研究所病院  
群馬大学重粒子線医学研究センター  
九州国際重粒子線がん治療センター  
神奈川県立がんセンター

● この臨床試験はどんな病気や病状に適応しますか？

『局所に留まっている、すい臓癌』が対象で主に以下の条件を満たす必要があります。

- 1)遠隔転移がなく、周りの血管に広がっていて手術が出来ない、すい臓癌と診断されている。
- 2)すい臓原発巣からの病理学的検査にて腺癌と診断されている。
- 3)内視鏡検査にて活動性の消化管潰瘍(胃、十二指腸)がない。
- 4)年齢が20歳以上80歳以下
- 5)歩行可能で身の回りのことはすべて可能。日中の50%以上はベッド外で過ごすことができる。
- 6)現在まですい臓癌に対する切除術や放射線療法を受けていない。

● どんな病気や症状は参加できませんか？

- 1)腫瘍が十二指腸や胃などに広がっている。
- 2)CT 検査等で腹水を認める。
- 3)黄疸に対して金属ステントを使用している。
- 4)すい臓癌に対する化学療法(抗がん剤)の初回投与から90日間以上経過している。
- 5)重篤な合併症を有する。
- 6)他の臓器に癌があり、これを治療中である。
- 7)妊娠又は妊娠している可能性がある、または授乳中の女性。

※詳細な条件は実施施設担当医師までお問合せください。



● どんな利点がありますか？

重粒子線では腫瘍に集中して高い線量を照射することができるので、正常組織障害も少なく短期の治療が可能となります。短期で1回の照射線量を高くすることでより殺細胞効果の高い治療が可能になります。12回照射しますが、約3週間で治療は終了します。

● 効果はどうですか？

切除不能すい臓癌に対して、化学療法であるゲムシタビンと重粒子線を併用した治療を行います。これまでの治療より高い治療効果を期待して、従来の治療方法による成績と本試験を比較検討することを目的としています。


● どんな副作用がありますか？

化学療法を併用するため、治療中は化学療法による副作用に加え、軽度の食欲不振、腹痛などの症状が出る場合があります。

治療後の晩期の副作用としては、消化管出血、潰瘍などが起きる場合がありますが、他の放射線治療と比較すると腫瘍周囲の正常組織の線量が極めて低いことから頻度も低くて軽いことが特徴です。

● 陽子線との違いは？

重粒子(炭素イオン)は陽子に比較して約12倍重いことから、標的に与える影響も大きくなります。X線治療の生物学的効果と比較すると、陽子線は1.1倍ですが、重粒子線は約3倍です。また、重いことから体内の深いところでも直進する性質が強く、深部でも線量集中性は、重粒子線が優れています。



● 重粒子線治療はどのように進みますか？

- ①外来を受診して治療の適応を判断します。
- ②適応ありと判断されたら、説明の上、治療の同意をいただき、治療予約をします。



③治療準備

- ・固定具の作製(照射位置がずれないようにするため)
- ・治療計画用CTの撮影(線量分布を作成します)  
※固定具作成から治療開始まで約1~2週間かかります。



④12回照射ですので、治療期間は約3週間です。

⑤実際の治療

- ・治療台上で技師による位置合わせを行い、照射は2~3分程度です。
- ・入室から退室までの時間は20分程度です。



⑥治療後は、基本的に紹介医の先生と治療施設の両方で経過観察します。

